



Примулы — многолетние растения. Среди них есть травы с прикорневыми листьями (розеточными), цельными или лопастными, черешковыми или сидячими. Цветки собраны в зонтики или почти головчатые соцветия, реже они одиночные. Окраска их очень разнообразная: желтая, розовая, фиолетовая, почти голубая, ярко-лиловая, почти черная. По всему земному шару в умеренных зонах и в альпийском поясе гор распространено около 500 диких видов. Уже давно они привлекали внимание людей как первые весенние цветущие растения. Им посвящено много сказаний и легенд.

С давних пор в садах культивируются примулы: ушковатая, аурикула — *Primula auricula* Lam., бесстебельная — *Primula acaulis* Hill., зубчатая — *Primula denticulata* Sm., Юлии — *Primula juliae* Rusn., которые цветут рано весной, а также примула Зибольда — *Primula sieboldii* Morr, и примула Биса — *Primula beesiana* Morr., цветущие летом. И последние годы вводится в культуру примула Воронова - *Primula woronowii* Los.

Примула ушковатая, аурикула имеет цветоносные стебли 20 -25 см. высотой. Листья гладкие, мясистые, обратноланцетные, собраны в плотную розетку. Цветы розовые, пурпурные, синеватые с желтым пятном в центре цветка, собраны в шаровидно зонтичное соцветие. Цветет в мае — июне.

Примула бесстебельная. Цветонос 15-20 см высотой. Листья морщинистые, яйцевиднопродолговатые, суженные в черешок. Несет один цветок, который может быть различной окраски. Цветет с апреля до конца мая.

Примула зубчатая со стрелкой шаровидного соцветия до 20 см. высоты. После цветения сильно вытягивается. Листья крупные, морщинистые, продолговатоовальные, переходящие в черешок. С нижней стороны, как и стрелки соцветия, сильно покрыты мучнистым налетом. Цветки бледно-сиреневые, реже белые, мелкие. Цветет в апреле—мае.

Примула Юлии. Имеет листья, собранные в прикорневую розетку, они мелкие яйцевиднопохожие, вытянутые в длинный черешок. Образуют дерновины. Цветки темно-фиолетовые, до 8 см в диаметре, одиночные, на тонких цветоножках 10-15 см

высотой. Цветет в мае, но часто наблюдается и вторичное цветение с сентября до глубокой осени.

Примула Воронова зацветает раньше остальных, как только стает снег, в начале апреля. Листья крупные, морщинистые, светло-зеленые, вытянуты в черешок. Цветоножки 15 см. высотой. Цветки розовые или белые, собраны в рыхлое зонтиковидное соцветие.

Культивируется в садах совсем недавно. В диком виде растет на Кавказе, в Кабардино-Балкарии.

Примула Зибольда имеет листья яйцевидноокруглой или яйцевидно-ланцетной формы, цветки карминово-розовые с желтым глазком в центре, цветет в мае - июне.

Примула Биса с листьями яйцевидными или продолговатыми, которые имеют сердцевидное или тупое основание, покрытое длинными волосками. Цветки красно-фиолетовые, собраны в короткое зонтиковидное соцветие. Цветет в мае - июне. Некоторые виды примул культивируются как горшечные культуры. В Каунасском ботаническом саду за последние годы было получено много гибридных примул. Одна из них — Ядвига с розовыми цветками особенно декоративна.

Размножаются примулы делением куста и семенами. Для получения чистых сортов применяется только деление кустов, так как примулы легко дают гибриды. Для омоложения растений кусты делит через 3-4 года. Грунтовые примулы применяют в бордюрах, рабатках на каменистых участках и среди газонов. Предпочитают глинистые почвы. Виды с длинными цветоносами дают хороший материал для срезки. Срезанные стебли сохраняют свежий вид в течение двух недель.