

Семейство Амариллисовые - Amaryllidaceae

Род луковичных трав насчитывает около 70 видов, растущих в тропиках и субтропиках Америки, но растения с огромными трубковидными цветками, выращиваемые в горшках, - гибриды. Хотя в народе они известны как амариллисы, это название другого растения, лишь иногда выращиваемого в садах.



*Hippeastrum hybrida* (Гиппеаструм гибридный)

Группа из трех-шести огромных трубковидных цветков на мощном стебле до 60 см высотой. Цветки имеют красную, розовую и белую окраску, иногда двухцветны. Существуют полумахровые формы. Цветет в безлистном состоянии, в конце зимы или весной. Цветочная стрелка развивается быстро. Крупные ремневидные листья обычно появляются либо вместе с распусканием цветков, либо после. Перед цветением зимой их не требуется помещать в темноту. Растение с ярко выраженным периодом покоя. Поэтому пышное цветение возможно только при соблюдении чередования периодов роста и покоя.

Гиппеаструм - одно из любимых растений в комнатном цветоводстве. В интерьерном озеленении хорошо использовать его в крупных групповых цветочных композициях и как одиночное растение. Гиппеаструм в срезанном виде украсит любое помещение. Каждый цветок держится около недели.

Освещение: Светолюбиво, хорошо растет в комнатах с южной экспозицией. Солнечное место для гиппеаструма особенно важно в момент появления цветочной стрелки. В период покоя не требовательно к освещению.

Температура: Для начала роста требует тепла, но цветки дольше сохраняются в прохладной комнате. В период покоя (осень-зима) прохладный режим содержания; оптимальная температура 8-13°C.

Влажность: Нетребовательно.

Субстрат: Дерновая и листовая земля, торф, песок (1:2:1:1), можно добавить немного золы.

Пересадка: Ее лучше проводить после цветения. Отцветшее соцветие срезают, чтобы не

ослабить луковицу. Растение пересаживают в небольшой горшок. Луковица должна выступать над поверхностью почвы на 1/2-1/3.

Полив: С наступлением осени уменьшают, после отмирания листьев сводят к минимуму. Во время цветения и роста листьев - более обильный.

Питание: В течение вегетационного сезона проводят регулярные подкормки слабым раствором коровяка с минеральными солями.

Размножение: Дочерними луковицами, после образования корней их отделяют от материнского растения и высаживают в горшки.