Семейство Амариллисовые - Amaryllidaceae
Род небольшой, известно всего 3 вида произрастающих в Южной Африке вечнозеленых многолетних растений с декоративными крупными соцветиями из воронковидных цветков. Кливия, принадлежащая к семейству амариллисовых, обладает скорее мясистыми корневищами, а не луковицами, что присуще остальным видам сорта.

Наиболее часто культивируют сорт C. miniata, который всегда ценился за свою декоративность и неприхотливость.

Clivia miniata (Кливия киноварная)
Крупные ремневидные супротивные листья, часто более 5 см ширины и 50-60 см длины, плотно охватывают друг друга, образуя подобие своеобразного веера, придавая декоративность растению. Весной или в начале лета среди листьев развивается цветочная стрелка до 50 см высотой, несущая пышный многоцветковый зонтик. Крупные соцветия из 10-20 небольших воронко-видных оранжевых или желтых цветков распускаются не сразу, а постепенно, поэтому цветение растения продолжительно, несколько недель. Известна садовая форма Striata с белыми или желтыми продольными полосами на листьях. В интерьерном озеленении может быть использована очень широко. Кливия при правильном уходе не создает никаких проблем. Это очень выносливое растение, которое цветет практически каждый год.

Освещение: Предпочитает рассеянный свет или полутень.

Температура: Зимний минимум 10°C. Избегайте высоких зимних температур.

Влажность: Нетребовательна.

Субстрат: Равные части дерновой или листовой земли, перегноя и песка.

Пересадка: Взрослое растение пересаживайте только когда корни начинают выталкивать растение из горшка и только по окончании цветения. Подбирают просторную емкость: крупный цветочный горшок или кадку. Обязательно делают хороший дренаж.

Полив: Умеренно поливайте с весны до осени и скудно зимой, пока длина цветоноса не достигнет 15 см. При слишком обильном поливе скорее вырастут листья, в то время как цветонос остановится в росте. Старайтесь не заливать растение, так как корни склонны

к загниванию.

Питание: Подкормки минеральными удобрениями (раз в декаду) проводят после цветения до конца августа.

Размножение: Отпрысками, которые отделяют от старых растений при пересадке. Можно семенами. Сеянцы зацветают не ранее, чем через 5-6 лет после посева.