



Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae

Род объединяет около 300 видов однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений, распространенных в умеренных областях Северного полушария, Средиземноморье и горах тропиков.

*Campanula carpatica* (Колокольчик карпатский)

Компактное растение 15-23 см высотой, летом усыпанное обращенными вверх голубыми или белыми чашечками цветков. Часто продается как горшечное растение, но после цветения его лучше высадить в сад.

*Campanula fragilis* (Колокольчик ломкий)

Свисающие стебли до 30 см длиной с белыми цветками в начале и середине лета.

*Campanula isophylla* (Колокольчик равнолистный)

Свисающие тонкие и длинные стебли покрыты округло-сердцевидными светло-зелеными листьями на длинных черешках. Весной и в середине лета в пазухах листьев появляются многочисленные нежно-голубые звездочки цветков, ничем по форме не отличающиеся от обычного лугового колокольчика. В комнатной культуре обычно выращивают две садовые формы: *Alba* с белыми и *Maui* с розовато-фиолетовыми цветками, более крупными. Цветение обычно продолжительное (до глубокой осени) при условии, что отцветшие цветки своевременно удаляются. Осенью удлиненные побеги подрезают и на зиму растения ставят в прохладное место.

*C. isophylla* рекомендуется использовать в качестве ампельного растения для озеленения светлых, небольших по площади жилых и офисных помещений, школ и детских садов, витрин магазинов, балконов.

Большинство остальных видов этой большой группы растений используют как бордюрные травы или в альпинарии. *C. carpatica* морозоустойчив, после цветения его можно высадить в сад. Остальные перечисленные здесь виды используют как ампельные растения теплиц и оранжерей, но ненадолго они могут украсить и помещение.

Освещение: Интенсивный свет, но не прямое солнце летом.

Температура: Зимний минимум 7°C для *C. fragilis* и *C. isophylla*. *C. carpatica* более хладостойкий.

Влажность: Нетребовательно, но изредка опрыскивайте листья.

Субстрат: Листовая и дерновая земля, перегной, торф и песок в равных долях.

Пересадка: По мере необходимости.

Полив: Летом регулярный и обильный, зимой ограниченный.

Питание: В период цветения необходимы обильные подкормки.

Размножение: Черенкованием (в феврале-марте) и семенами.